

Paramètres utilisés pour la cartographie

| Code | Description | +7m | -7m | Improductif | Non forestier |
|------|--------------------------------|-----|-----|-------------|---------------|
| F | Essence de feuilles | X | X | X | X |
| CT | Année d'intervention partielle | X | X | X | X |
| CP | Année d'intervention partielle | X | X | X | X |
| CT | Année d'intervention partielle | X | X | X | X |
| CP | Année d'intervention partielle | X | X | X | X |
| CT | Année d'intervention partielle | X | X | X | X |
| CP | Année d'intervention partielle | X | X | X | X |

Le détail est estimé par classe, soit avec des valeurs à ± 5% à l'exception de la valeur 25% (25 ± 2%)

Exemple d'appellation

| Code | Année d'appellation | Année d'intervention | Intervention d'origine | Improductif | Non forestier |
|------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|---------------|
| F | F | F | F | F | F |
| F | F | F | F | F | F |
| F | F | F | F | F | F |

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES
Les résineux constituent 75% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE À DOMINANCE RÉSINEUSE
Les résineux constituent de 55% à 74% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE SANS DOMINANCE
Les résineux constituent de 45% à 54% de la surface terrière du peuplement.
MIXTE À DOMINANCE FEUILLEUSE
Les résineux constituent de 25% à 44% de la surface terrière du peuplement.
FEUILLEUX
Les résineux constituent moins de 25% de la surface terrière du peuplement.

| CODE | RÉSINEUX | CODE | FEUILLEUX | CODE | FEUILLEUX |
|------|--------------------------|------|------------------------|------|-----------------------------------|
| EB | Épétite blanche | BG | Bouillay gris | FO | Feuille noir |
| EN | Épétite noire | BJ | Bouillay jaune | FP | Feuille rouge |
| EU | Épétite rouge | BF | Bouillay à cœur blanc | FB | Feuille à cœur blanc |
| EV | Épétite de Norvège | CB | Chêne blanc | FX | Feuille à gros fruits |
| ME | Mélèze hybride | CC | Chêne à gros fruits | FZ | Feuille rebrousse à l'entremesure |
| MA | Mélèze japonais | CH | Chêne à cœur blanc | FE | Feuille à grosses feuilles |
| ML | Mélèze laricin | CI | Chêne bicoloré | NC | Noyer cendré |
| PC | Pin rigide (des côcoaux) | CC | Chêne à cœur blanc | CA | Chêne rouge |
| PI | Pin sylvestre | CR | Chêne rouge | CC | Chêne à cœur blanc |
| PN | Pin noir | CV | Chêne à cœur blanc | CA | Chêne rouge |
| PS | Pin sylvestre | EA | Érable argenté | OV | Ostrya de Virginie |
| PK | Pin kora | EA | Érable noir | PT | Paulownia |
| RB | Résineux mélangés | EO | Érable rouge | PE | Peuplier hybride |
| RN | Résineux non mélangés | ES | Érable à sucre | PF | Peuplier d'Amérique |
| SX | Sapin Baumanier | FR | Frêne blanc (de l'Est) | PD | Peuplier d'Amérique |
| TO | Touya occidanta | FR | Frêne blanc (de l'Est) | PT | Paulownia |

CLASSES D'ÂGE

| RELEVEMENTS ÉCUEILLIS | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| | (0 à 20) | (21 à 40) | (41 à 60) | (61 à 80) | (81 à 100) | (101 et plus) |

RELEVEMENTS ÉCUEILLIS
Jeune inéquie (JN) Vieux inéquie (VN)

Structure verticale des tiges de 7 m et plus

| Étage | Intérieur (INI) | Supérieur (SUP) |
|----------------------|--|------------------|
| Monétage (MO) et 110 | Un seul étage composé de tiges homogènes en hauteur et en couverture > 25% | |
| B-stage (BU) et 120 | Couverture > 25% | Couverture > 25% |
| Multitage (MU) | Plus de 2 étages de tiges de 7 mètres et plus. Se retrouvent dans cette catégorie les peuplements jeunes inéquie (JN) et vieux inéquie (VN). | |


| CODE | PERTURBATIONS D'ORIGINE | CODE | INTERVENTIONS PARTIELLES |
|------|-------------------------|------|---------------------------|
| BR | Brûls total | CA | Coupe d'assainissement |
| CH | Chablis total | CM | Coupe d'amélioration |
| DT | Dépensement total | CO | Coupe d'ensemencement |
| ES | Épidémie grave | CP | Coupe en limite |
| VER | Verges grave | CEA | Coupe progressive inéquie |
| | | CCP | Coupe progressive inéquie |
| | | CJP | Coupe progressive inéquie |
| | | CJP | Coupe progressive inéquie |
| | | CJP | Coupe progressive inéquie |

TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS

| CODE | DÉNOMINATION | Taux d'inclinaison |
|------|--------------------------------|--------------------------|
| DH | Déroulé ou semi-déroulé humide | A Nulle 0% à 3% |
| DS | Déroulé ou semi-déroulé sec | B Faible 4% à 9% |
| AL | Altitude | C Modérée 9% à 15% |
| | | D Forte 16% à 24% |
| | | E Extrême 25% à 30% |
| | | S Entouré de 41% et plus |

CODE NON FORESTIER

| CODE | DÉNOMINATION |
|------|---|
| A | Terrain agricole |
| SEP | Site d'implantation et d'abandon de ligne |
| AF | Terrain agricole localisé dans les secteurs à vocation forestière |
| ANT | Mieux forestier perturbé par l'activité humaine (non-bois) |
| CFO | Camp forestier |



- Voies de communication et ponts**
 - Classe 1, HN - Hors norme
 - Classe 2
 - Classe 3
 - Classe 4-5
 - NF - Non classé, ne répond pas aux critères HN, 1 à 4
 - NF - Non forestier (Adresse Québec)
 - Pont forestier
- Hydrographie écoforestière**
 - Cours d'eau intermittent
 - Cours d'eau permanent, canal
 - Hydrographie
- Obstacles et infrastructures**
 - Bâtiment, site, réservoir
 - Chute, rapide, écoule
 - Centre de ski alpin
 - Hydrobase
 - Mine à ciel ouvert
 - Pylône
 - Terrain de camping
 - Tour de télécommunication, tour
 - Barrage, barrage de castor
 - Remonte mécanique
 - Ligne de transport d'énergie
- Courbe de niveau**
 - Courbe de niveau métresse
 - Courbe de niveau intermédiaire
 - Eskar
- Peuplement écoforestier**
 - Peuplement écoforestier
 - Peuplement improductif
 - Peuplement non forestier
- Métadonnées**
 - Surface de référence géodésique
 - Système de référence géodésique
 - Système de coordonnées planaires du Québec (SCOQP)
 - Base
 - Origine des altitudes
 - Équidistance des courbes de niveau
 - Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2006
 - Coordonnées géographiques au centre
 - Longitude (méridien central)
 - Latitude d'origine (équateur) 0°
 - Coordonnées d'origine
 - Facteur d'échelle

Sources
Donnée : Assise cartographique (données topographiques)
Organisation : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Date : 14/04/2005

Informations forestières
Nombre inventaires écoforestiers : 56 inventaires
Année des photos pour la production de la carte (Expertise des écosystèmes forestiers) : 2015
Date de mise à jour provisoire : Octobre 2023
Superficie minimale d'appellation des peuplements : 4 hectares

Réalisation
Production : Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
2105, 4^e Avenue Duval, Suite A109
Québec, Québec, G1M 3R3
Date de production : 2023
Diffusion : Direction des inventaires forestiers

AVERTISSEMENT
Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'ont aucune valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées à titre indicatif.
La couche de chemin est produite par le MRNF à partir du système ROUTARD et contient l'information la plus à jour disponible.
© Gouvernement du Québec