# 22H03SO
(22H03-200-0101)

# Carte écoforestière




## STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

**Paramètres utilisés pour la cartographie**

| Code | Description | + 7m | -7m | Improductif | Non forestier |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Type de couvert | | X | | |
| SS | Groupement d'essence 1* | X | | | |
| SSSB | Groupement d'essence 2* | X | | | |
| A | Indice densité | X | X | | |
| I | Indice hauteur | X | X | | |
| CT | Intervention jeune | X | X | | |
| 78 | Année d'intervention d'origine | X | X | | |
| DH | Classe d'eau | X | X | | |
| CJ | Intervention partielle | X | X | | |
| 56 | Année d'intervention partielle | X | X | | |
| P | Classe de pente | X | X | X | |
| DH | Code de terrain 1* | X | | X | X |
| NF | Code de terrain 4* | X | | X | X |

**Exemple d'appellation**

| +7m de hauteur | -7m de hauteur | Improductif | Non forestier |
|---|---|---|---|
| SS B 3<br>JIN EC 96 C | CJ 98 D | A DH | NF |
| SSSB A2<br>50 D | F A 5<br>CT 78 10 D | | |

### TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.
F

MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
MI

| CODE | ESSENCES RESINEUSES 1* |
|---|---|
| E | Epinette blanche |
| EB | Epinette blanche et noire |
| EP | Pin blanc |
| PR | Pin rouge |
| PG | Pin gris |
| ME | Mélèze laricin |
| S | Pruche de l'est |
| R | Résineux indéterminés |
| PIC | Picéa indéterminé |
| C | Thuya occidental |

| CODE | ESSENCES FEUILLUS 1* |
|---|---|
| BB | Bouleau à papier |
| BJ | Bouleau jaune |
| CH | Chêne rouge |
| CB | Chêne blanc |
| ER | Erable à sucre |
| FT | Feuillu tolérant (1) |
| FI | Feuillu intolérant (2) |
| FC | Feuillu humide (3) |
| FNC | Feuillus non commercial |
| FA | Frêne d'Amérique |
| HG | Hêtre à grandes feuilles |
| OR | Orme d'Amérique |
| PD | Peuplier à grandes dents |
| PB | Peuplier baumier |
| PT | Peuplier faux-tremble |
| TA | Tilleul d'Amérique |

| CODE | ESSENCES RESINEUSES 4* et 5* |
|---|---|
| EB | Epinette blanche |
| EP | Epinette blanche et noire |
| PB | Pin blanc |
| PR | Pin rouge |
| PG | Pin gris |
| ME | Mélèze laricin |
| PU | Pruche de l'est |
| R | Résineux indéterminés |
| SB | Sapin Baumier |
| C | Thuya occidental |

| CODE | ESSENCES FEUILLUS 4* et 5* |
|---|---|
| BP | Bouleau à papier |
| BJ | Bouleau jaune |
| CJ | Caryer à fruits doux |
| CC | Caryer cordiforme |
| CT | Caryer Tardif |
| CH | Chêne à gros fruits |
| CR | Chêne rouge |
| CB | Chêne rouge |
| EO | Erable rouge |
| ES | Erable à sucre |

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Orme, Tilleul (applicable 4* et 5*)
(2) Ex: Peuplier, Bouleau, Erable rouge en association (applicable 4* et 5*)
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4* et 5*)

### INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

| | HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET CODOMINANTES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22 m | 17m à 22m | 12m à 17m | 7m à 12m | 4m à 7m | 2m à 4m | 0m à 2 m* |
| Classes de hauteur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Classe de densité** | | | | | | | |
| **61% à 100%** | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | SD SD |
| **41% à 60%** | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | SD SD |
| **26% à 40%** | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | SD SD |
| **25% à 40%** | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | SD SD |
| | R | Densité recouvrement haute | | | | | H7* |
| | I | Densité recouvrement inférieure | | | | | I7* |

(*): Information provenant d'image satellite

### CLASSES D'ÂGE

| PEUPLEMENTS | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉQUIENNES | (0 à 20) | (21 à 40) | (41 à 60) | (61 à 80) | (81 à 100) | (101 et plus) | |
| PEUPLEMENTS INÉQUIENNES | Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans) | | | Jin-gl | | | |
| OU | Vieux inéquienne ou irrégulier (origine > 80 ans) | | | Vin-Vir | | | |
| IRRÉGULIER | | | | | | | |
| PEUPLEMENTS ÉTAGÉS | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | + |
| | 30 | 50 | 70 | 90 | 120 | + | - |
| | 10 | 50 | 70 | 90 | 120 | + | - |
| | 30 | 70 | 90 | 120 | + | - | - |
| | 50 | 70 | 90 | 120 | + | - | - |
| | 10 | 70 | 90 | 120 | + | - | - |
| | 10 | 90 | 90 | 120 | + | - | - |
| | 30 | 90 | 120 | + | - | - | - |
| | 50 | 90 | 120 | + | - | - | - |
| | 70 | 90 | 120 | + | - | - | - |
| | 10 | 120 | 120 | + | - | - | - |

### INTERVENTIONS PARTIELLES

| CODE | PERTURBATIONS D'ORIGINE |
|---|---|
| CHT | Chablis total |
| DT | Dépérissement total |
| ES | Épidémie grave |
| BR | Brûlis total |
| FR | Friche |
| VER | Verglas grave |

| | INTERVENTIONS D'ORIGINE |
|---|---|
| CPR | Coupe avec protection de la régénération |
| CRS | Coupe avec réserve de semenciers |
| CET | Coupe par bande finale |
| CPE | Coupe progressive d'ensemencement |
| CT | Coupe totale |
| CRB | Coupe de récupération dans un brûlis |
| ERR | Élimination des tiges résiduelles |
| ENS | Ensemencement |
| ENM | Ensemencement avec mini semis |
| P | Plantation |
| PLN | Plantation de semis cultivés à racines nues |
| PLR | Plantation de semis cultivés en récipients |
| PLB | Plantation de boutures |
| REA | Régénération d'une aire d'déranchage |
| RIA | Régénération d'un site occupé |
| RPS | Reboisement d'une infrastructure abandonnée<br>Transportation en vertu d'un plan spécial d'aménagement |
| BRP | Brûlis partiel |
| CHP | Chablis partiel |
| DP | Dépérissement partiel du feuillu |
| EL | Épidémie légère |
| VEP | Verglas partiel |

| CODE | PERTURBATIONS MOYENNES |
|---|---|
| ECL | Éclaircie commerciale |
| CRR | Récolte des tiges résiduelles et des rebuts |
| RRB | Regarnis avec boutures |
| RRN | Regarnis avec plants utilisés à racines nues |
| RRR | Regarnis de plants cultivés en récipients |

| CODE | PERTURBATIONS D'ORIGINE |
|---|---|
| CPH | Coupe avec protection de la régénération et des sols |
| CJP | Coupe de jardinage par parquets |
| CJT | Coupe de jardinage avec trouées |
| CEA | Coupe de jardinage |
| CB | Coupe par bande |
| CTR | Coupe par trouées |
| CJ | Coupe de jardinage |
| CE | Coupe partielle et épidémie légère |
| CPM | Coupe progressive d'ensemencement (mélangée) |
| CPC | Coupe progressive d'ensemencement (résineux) |
| DRM | Dégagement mécanique de la rég. naturelle |
| DR | Éclaircie commerciale |
| ECC | Éclaircie commerciale d'éclaircie |
| ECE | Éclaircie commerciale |
| ENR | Ensemencement |
| FER | Fertilisation |
| REP | Récolte dans les bandes vertes résiduelles |
| RRS | Récolte dans les lisières boisées |
| CRR | Récolte des tiges résiduelles et des rebuts |
| RRB | Regarnis avec boutures |
| RRN | Regarnis avec plants utilisés à racines nues |
| RRR | Regarnis de plants cultivés en récipients |

### TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS

| CODE | |
|---|---|
| DH | Dénudé ou semi-dénudé humide |
| DS | Dénudé ou semi-dénudé sec |
| AL | Aulnaie |

### CLASSES DE PENTE

| CODE | DÉSIGNATION | TAUX D'INCLINAISON |
|---|---|---|
| A | Nulle | 0% à 3% |
| B | Faible | 4% à 8% |
| C | Douce | 9% à 15% |
| D | Modérée | 16% à 30% |
| E | Forte | 31% à 40% |
| F | Abrupte | 41% et plus |
| S | Sommet | Entouré de 41% et plus |

## SÉRIE PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS 1/20 000




**Voies de communication et ponts**
- Classe 1, HN - Hors norme
- Classe 2
- Classe 3
- Classe 4
- NC - Non classé. ne répondent pas aux critères HN, 1 à 4
- NF - Non forestier (Adresse Québec)
- Pont forestier

**Hydrographie écoforestière**
- Cours d'eau intermittent
- Cours d'eau permanent, canal
- Hydrographie

**Obstacles et infrastructures**
- Bâtiment, silo, réservoir
- Chute, rapide, écueil
- Centre de ski alpin
- Hydrobase
- Mine à ciel ouvert
- Pylône
- Terrain de camping
- Tour de télécommunication, tour
- Barrage, barrage de castor
- Remontée mécanique
- Ligne de transport d'énergie

**Courbe de niveau**
- Courbe de niveau maîtresse
- Courbe de niveau intermédiaire
- Esker

**Morcellement**
- Morcellement foncier

**Frontières**
- Frontière internationale
- Frontière interprovinciale
- Frontière Québec – Terre-Neuve-et-Labrador (cette frontière n'est pas définitive)

**Peuplement écoforestier**
- Peuplement écoforestier
- Peuplement improductif
- Peuplement non forestier

**Métadonnées**

| | |
|---|---|
| Surface de référence géodésique | Ellipsoïde GRS 80 |
| Système de référence géodésique | NAD 83 (SCRS) |
| Projection cartographique | Mercator transverse modifiée (MTM), zone de 3°.<br>Système de coordonnées planes du Québec (SCOPQ)<br>fuseau 5 |
| Origine des altitudes | CGVD 28 (Niveau moyen des mers) |
| Équidistance des courbes de niveau | 10 mètres |
| Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 2008 | 20° 23' OUEST |
| Coordonnées géographiques au centre de la feuille | 65°22'31"O 49°3'45"N |
| Longitude d'origine (méridien central) | 64° 30' ouest |
| Latitude d'origine (équateur) | 0° |
| Coordonnées d'origine | X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre |
| Facteur d'échelle | 0.9999 |

0 0.3 0.5 1 1.5 2km

**Sources**

| Donnée | Organisme | Date |
|---|---|---|
| Assise cartographique (données topographiques) | Ministère des Ressources naturelles et de la Faune | 14/04/2005 |
| Hydrographie surfacique | Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs | 06/07/2020 |

**Informations forestières**

| | |
|---|---|
| Numéro d'inventaire écoforestier | 5e programme |
| Année des photos pour la production de la carte (Superficie de recouvrement principale) | 2016 |
| Date de mise à jour provinciale | Juillet 2020 |
| Superficie minimale d'appellation des peuplements | 4 hectares |

**Réalisation**

Production : Ministère des Forêts, Faune, et des Parcs
Direction des inventaires forestiers
5700, 4e Avenue Ouest, porte A108
Québec (Québec), G1H 6R1

Diffusion : Directions des inventaires forestiers

**AVERTISSEMENT**

Les limites de morcellement foncier représentées sur cette carte n'offre AUCUNE valeur légale. Ces limites sont NON OFFICIELLES et sont utilisées qu'à titre indicatif

©Gouvernement du Québec

Forêts, Faune et Parcs
Québec

22H03SO
(22H03-200-0101)