



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

sence 3 ^e X sence 4 ^e X X	X		
sence 4 ^e X			
X			
X			I
	X		
ine X	X		
ion d'origine X	X		
X	X		
elle X	X		
ion partielle X	X		
X	X	X	
X		X	X
e X		X	X
	ion d'origine X X elle X ion partielle X X X X	X	X





(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleuil (applicable 4° et 5°)
 (2) Ex. Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4° et 5°)
 (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4° et 5°)

PEUPLEMENTS	10		30		50		70		80		90	
ÉQUIENNES	(0 à 20)		(21 à 40)		(41 à 60)		(61 à 80)		(81 à 100)		(101 et plus	
PEUPLEMETS INÉQUIENNES OU IRRÉGULIER	Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 80 ans) Vieux inquienne ou irrégulier (origine > 80 ans) Vin-Vir											
PEUPLEMENTS ÉTAGÉS	10-	30-	30-	-	50-	-	70-	-	90-	-	120-	-
	30 10-	10 50-	30 30-	50-	50 50-	70-	70 70-	90-	90 90-	120-	120	
	50	10	50	30-	70	50	90	70	120	90	-	-
	10- 70	70- 10	30- 70	70- 30	50- 90	90- 50	70- 120	120- 70	-	-	-	-
	10- 80	90- 10	30- 80	80- 30	50- 120	120- 50	-	-	-	-	-	-
	10- 120	120- 10	30- 120	120- 30	-	-	-	-	-	-	=	-

