
















Carte écoforestière

31F15NO
(31F15-200-0201)



31F15NO
(31F15-200-0201)



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

| Paramètres utilisés pour la cartographie | | I |
|--|------------------------------------|-----|
| Code | Description | +7m |
| SS | Type de couvert | -7m |
| SESS | Grouement d'essence 3 ^a | X |
| SESS | Grouement d'essence 4 ^a | X |
| IND | Indice hauteur | X |
| 72 | Année d'intervention d'origine | X |
| JN | Classe d'âge | X |
| JN | Classe d'âge partielle | X |
| 98 | Année d'intervention partielle | X |
| IND | Indice de densité | X |
| DH | Code de terrain 3 ^b | X |
| DH | Code de terrain 4 ^b | X |

| Exemple d'appellation | |
|-----------------------|----------------|
| JN EC 88 C | -7m de hauteur |
| JN EC 88 D | +7m de hauteur |
| GRSS AD 50 D | Improductif |
| F A S CT 78 10 D | Non forestier |

| I | Improductif | Non forestier |
|----|---------------------|---------------|
| BP | Bouleau jaune | BU |
| BR | Bouleau rouge | BR |
| PR | Erable rouge | ER |
| ME | Erable blanc | EB |
| MD | Merisier luisant | ML |
| RD | Reine des prés | RD |
| RC | Reine des montagnes | RM |
| CR | Chêne rouge | CH |
| TC | Prêcheur | PT |
| ES | Prêcheur épineux | EP |

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RESINEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.

FEUILLEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MÉLANGE Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale.

CODE ESSENSES RÉSINEUSES 3^a

CODE ESSENSES FEUILLEUSES 3^a

CODE ESSENSES RÉSINEUSES 4^a & 5^b

CODE ESSENSES FEUILLEUSES 4^a & 6^b

CODE ESSENSES FEUILLEUSES 4^a & 7^b

(1) Chêne, Chêne, Hêtre, Noyer, Chêne. Tissu sapicole d'origine 4^a (2) Chêne, Chêne, Hêtre, Noyer, Chêne. Tissu sapicole d'origine 5^b (3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme rouge (appelé 4^a et 5^b)

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

| HAUTEUR MOYENNE DES TISSUS DOMINANTES ET COORDONNATES | |
|---|-----------|
| 22 m | 110 à 220 |
| 44 m | 120 à 230 |
| 66 m | 130 à 240 |
| 88 m | 140 à 250 |
| 110 m | 150 à 260 |
| 132 m | 160 à 270 |
| 154 m | 170 à 280 |
| 176 m | 180 à 290 |
| 198 m | 190 à 300 |
| 220 m | 200 à 310 |
| 242 m | 210 à 320 |
| 264 m | 220 à 330 |
| 286 m | 230 à 340 |
| 308 m | 240 à 350 |
| 330 m | 250 à 360 |
| 352 m | 260 à 370 |
| 374 m | 270 à 380 |
| 396 m | 280 à 390 |
| 418 m | 290 à 400 |
| 440 m | 300 à 410 |
| 462 m | 310 à 420 |
| 484 m | 320 à 430 |
| 506 m | 330 à 440 |
| 528 m | 340 à 450 |
| 550 m | 350 à 460 |
| 572 m | 360 à 470 |
| 594 m | 370 à 480 |
| 616 m | 380 à 490 |
| 638 m | 390 à 500 |
| 660 m | 400 à 510 |
| 682 m | 410 à 520 |
| 704 m | 420 à 530 |
| 726 m | 430 à 540 |
| 748 m | 440 à 550 |
| 770 m | 450 à 560 |
| 792 m | 460 à 570 |
| 814 m | 470 à 580 |
| 836 m | 480 à 590 |
| 858 m | 490 à 600 |
| 880 m | 500 à 610 |
| 902 m | 510 à 620 |
| 924 m | 520 à 630 |
| 946 m | 530 à 640 |
| 968 m | 540 à 650 |
| 990 m | 550 à 660 |

(*) Information provenant d'image satellite

Classe de hauteur

Classes d'âge

Indices de densité

Indices de hauteur

Densité recouvrement inférieure

CLASSES D'ÂGE

| PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS | 10 | 30 | 70 | 80 | 90 | 100 | 101 à 102 |
|---------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----------|
|---------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----------|