


31K03NO
(31K03-200-0201)

Carte écoforestière



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE									
Paramètres utilisés pour la cartographie									
Code Description +7m -7m Improductif Non forestier									
SS	Type de couvert	Forêt	X						
SEIS	Gougeement d'essence ^a			X					
2	Indice hauteur				X				
78	Année d'intervention d'origine					X			
JN	Classe d'âge						X		
CC	Interventions partielles							X	
98	Interventions partielles								X
ED	Code de terrain ^b								X
DH	Code de terrain ^c								X
Exemple d'appellation									
+7m de hauteur		+7m de hauteur	Improductif		Non forestier				
SS	JN EC 98 C	CJ 98 D							
CC	JN CC 50 D	F A S C T 78 10 D							
TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE									
RESINEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses									
RÉSINEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues									
MÉLANGES Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale									
CODE ESSENCE RÉSINEUSES ^d CODE ESSENCE FEUILLEUSES ^d									
E	Épinette blanche	BR	Bouleau blanc						
E	Épinette rouge et noire	BU	Bouleau jaune						
P	Pin blanc	CO	Érable rouge						
M	Pin noir	CR	Érable noir						
R	Mélèze lancin.	FT	Fœule bicolore (1)						
R	Mélèze hameau	FT	Fœule bicolore (2)						
S	Résineux indéterminé	FR	Fœule hameau						
		FL	Fœule rousse						
CODE ESSENCE RÉSINEUSES ^e CODE ESSENCE FEUILLEUSES ^e CODE ESSENCE FEUILLEUSES ^f									
BP	Bouleau à papier	FX	Feuille indéterminé						
PF	Pin blanc	FR	Fœule d'érable						
PS	Pin noir	CF	Carag. à fruits doux						
CT	Centrev. Tardif	CR	Orme d'Amérique						
MT	Mélèze lancin.	CH	Orme des bois						
MR	Mélèze hameau	CR	Orme rouge						
RD	Résineux indéterminé	PT	Prêle fœule-tremble						
		ES	Prêle à soie						
(1) Sapin, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Chêne. Tissu sapicole à l'origine d' ^g 75% de la surface terrière totale									
(2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme magique (appelé ^h d' ^g 75% de la surface terrière totale)									
INDICES DENSITÉ-HAUTEUR									
HAUTEUR MOYENNE DES TISSUS DOMINANTES ET D'ORDINANCES									
22 m 17m à 22m 12m à 17m 10m à 15m 8m à 10m 6m à 8m 4m à 6m 2m à 4m									
Classes de hauteur									
1	2	3	4	5	6	7			
A1	A2	A3	A4	A5	SD	SD			
B1	B2	B3	B4	B5	SC	SC			
C1	C2	C3	C4	C5	SD	SD			
D1	D2	D3	D4	D5	SD	SD			
E1	E2	E3	E4	E5	SD	SD			
T0									
Densité recouvrement inférieure									
(*) Information provenant d'image satellite									
CLASSES D'ÂGE									
PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS									
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100									
jeune inéquale ou irrégulier (origine < 80 ans)									
Vieux inéquale ou irrégulier (origine > 80 ans)									
Vie/Vir									
PEUPLEMENTS ETAGES									
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100									
jeune régulier et régulier									
peuplement régulier et régulier									
PEUPLEMENTS D'ORIGINE									
Coupes préventives ou de régénération									
Coupes avec réserve de semences									
Coupes avec préparation de sols									
Coupes progressives d'ensemencement									
Coupes totales									
Coupes partielles et épidémie légère									
Elimination des tiges résiduelles									
Ensemencement avec minis serres									
Plantation de serres cultivées à racines nues									
Plantation progressive d'ensemencement (réseaux)									
Plantation de boutures									
Régénération d'une décharge									
Réhabilitation d'un déversoir									
Réhabilitation d'un déversoir abandonné									
Réhabilitation d'un déversoir avec un plancher d'aménagement									
PERTURBATIONS MOYENNES									
Coupes partielles									
Chablis partiel									
Chablis total									