


31N11SO
(31N11-200-0101)

Carte écoforestière



| STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| Paramètres utilisés pour la cartographie | | | | | | | | | |
| Code | | | | | | | | | Description |
| +7m | | | | | | | | | -7m |
| -7m | | | | | | | | | Improductif |
| Non forestier | | | | | | | | | |
| Exemple d'appellation | | | | | | | | | |
| +7m de hauteur | | | | | | | | | -7m de hauteur |
| JIN EC 88 C | | | | | | | | | CJ 98 D |
| GROS AD 50 D | | | | | | | | | F A S CT 78 10 D |
| Exemple de terrains | | | | | | | | | Improductif |
| DH | | | | | | | | | Non forestier |
| Code de terrains | | | | | | | | | |
| TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE | | | | | | | | | |
| RESINEUX | | | | | | | | | |
| PEUVENT Prendre plus de 75% de la surface totale occupée par les essences résineuses | | | | | | | | | |
| RÉSINEUX | | | | | | | | | |
| PEUVENT Prendre plus de 75% de la surface totale occupée par les essences feuillues | | | | | | | | | |
| FEUILLEUX | | | | | | | | | |
| MÉLANGES Prendre dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface totale | | | | | | | | | |
| CODE | | | | | | | | | |
| ESSENCE RÉSINEUSES * | | | | | | | | | |
| CODE | | | | | | | | | |
| ESSENCE FEUILLEUSES * | | | | | | | | | |
| CODE | | | | | | | | | |
| ESSENCE FEUILLEUSES # *# | | | | | | | | | |
| CODE | | | | | | | | | |
| ESSENCE FEUILLEUSES #*# | | | | | | | | | |
| (1) Sapin, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Chêne, Tilleul (appelé 4*) | | | | | | | | | |
| (2) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme rouge (appelé 4*) | | | | | | | | | |
| CODE | | | | | | | | | |
| INDICES DENSITÉ-HAUTEUR | | | | | | | | | |
| HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET D'ORDINAIRES | | | | | | | | | |
| 22 m 17m à 22m 12m à 17m 40m à 70m 20m à 40m | | | | | | | | | |
| Classes de hauteur | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | | | | |
| Classe 1 à 50% | | | | | | | | | |
| A1 A2 A3 A4 A5 SD SD | | | | | | | | | |
| Classe 6 à 65% | | | | | | | | | |
| C1 C2 C3 C4 C5 SD SD | | | | | | | | | |
| Classe 66 à 95% | | | | | | | | | |
| H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 | | | | | | | | | |
| Densité recouvrement inférieure | | | | | | | | | |
| (*): Information provenant d'image satellite | | | | | | | | | |
| INDICES DENSITÉ-HAUTEUR | | | | | | | | | |
| HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET D'ORDINAIRES | | | | | | | | | |
| 22 m 17m à 22m 12m à 17m 40m à 70m 20m à 40m | | | | | | | | | |
| Classes de hauteur | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | | | | | | | | | |
| Classe 1 à 50% | | | | | | | | | |
| A1 A2 A3 A4 A5 SD SD | | | | | | | | | |
| Classe 6 à 65% | | | | | | | | | |
| C1 C2 C3 C4 C5 SD SD | | | | | | | | | |
| Classe 66 à 95% | | | | | | | | | |
| H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 | | | | | | | | | |
| Densité recouvrement inférieure | | | | | | | | | |
| (*): Information provenant d'image satellite | | | | | | | | | |
| CLASSES D'ÂGE | | | | | | | | | |
| PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS | | | | | | | | | |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (101 et plus) | | | | | | | | | |
| jeune inéquale ou irrégulier (origine > 80 ans) | | | | | | | | | |
| Vieux inéquale ou régulier (origine < 80 ans) | | | | | | | | | |
| PEUPLEMENTS ÉTAGES | | | | | | | | | |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | | | | | | | | | |
| PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS | | | | | | | | | |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | | | | | | | | | |
| PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS | | | | | | | | | |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | | | | | | | | | |
| PEUPLEMENTS ÉCOFORESTIERS | | | | | | | | | |
| 10 20 30 40 50 | | | | | | | | | |