31O10NE
(31O10-200-0202)

Carte écoforestière



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie

Code	Description	+ 7m	-7m	Improductif	Non forestier
P	Type de couvert	X	X		
SS	Groupement d'essence 3*	X			
SBSB	Groupement d'essence 4*	X			
A	Indice densité	X	X		
Z	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention recigne	X	X		
T8	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
S8	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
H	Code de terrain 3*	X		X	X
NF	Code de terrain 4*	X		X	X

Exemple d'appellation

+7m de hauteur	-7m de hauteur	Improductif	Non forestier
SS B 3 JIN EC 96 C	CJ 98 D	A DH	NF
SBSB A2 50 D	F A 5 CT 78 10 D		

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.
F

MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
MR

CODE	ESSENCES RESINEUSES 3"	CODE	ESSENCES FEUILLUES 3"
O	Épinette blanche	BB	Bouleau à papier
E	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux
PR	Pin rouge	CO	Caryer cordiforme
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif
SE	Mélèze laricin	FG	Frêne à fruits forts
PU	Pruche de l'est	OH	Chêne bicolore
RX	Résineux indéterminés	OR	Chêne rouge
SB	Sapin Baumier	EG	Érable rouge
TO	Thuya occidental	ES	Érable à sucre

CODE	ESSENCES RESINEUSES 4" et 5"	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4" et 5"	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4" et 5"
EB	Épinette blanche	BP	Bouleau à papier	FX	Feuillus indéterminés
EP	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune	FMC	Feuillus non commercial
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux	FA	Frêne d'Amérique
PR	Pin rouge	CO	Caryer cordiforme	HG	Hêtre à grandes feuilles
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif	OS	Orme d'Amérique
SE	Mélèze laricin	FG	Frêne à fruits forts	OT	Orme de Thomas dents
PU	Pruche de l'est	OH	Chêne bicolore	PA	Peuplier baumier
RX	Résineux indéterminés	OR	Chêne rouge	PT	Peuplier faux-tremble
SB	Sapin Baumier	EG	Érable rouge	TA	Tilleul d'Amérique
TO	Thuya occidental	ES	Érable à sucre		

(1): Cèdre, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Orme, Ostéier, Tilleul (applicable en 5")
(2): Ex: Peuplier, Bouleau, Erable rouge en association (applicable 4" et 5")
(3): Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4" et 5")

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

		HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET CODOMINANTES						
		22 m et +	17m à 22m	12m à 17m	7m à 12m	4m à 7m	2m à 4m	2m et -
Classes de hauteur		A	B	C	D	E	F	G
Classe de densité								
61% à 100%	A	A1	A2	A3	A4	A5	SO	SO
61% à 80%	B	B1	B2	B3	B4	B5	SO	SO
41% à 60%	C	C1	C2	C3	C4	C5	SO	SO
25% à 40%	D	D1	D2	D3	D4	D5	SO	SO
	E	Densité recouvrement haute						17*
	I	Densité recouvrement inférieure						17*

(*): Information provenant d'image satellite

CLASSES D'ÂGE

PEUPLEMENTS ÉQUIENNES	10 (0 à 20)	30 (21 à 40)	50 (41 à 60)	70 (61 à 80)	80 (61 à 100)	90 (101 et plus)
PEUPLEMENTS INÉQUIENNES OU IRRÉGULIER	Jeune inequienne ou irregulier (origine < 80 ans)			Vieux inequienne ou irregulier (origine > 80 ans)		
				Vin-Vir		

PEUPLEMENTS ÉTAGÉS										
	15	30	50	50	70	70	90	120		
	30	50	30	50	70	90	90	120		
	15	30	50	50	70	90	90	120	120	-
	30	50	30	50	70	90	90	120	120	-
	15	30	50	50	70	90	90	120	120	-
	30	50	30	50	70	90	90	120	120	-
	15	30	50	50	70	90	90	120	120	30
	30	50	30	50	70	90	90	120	120	30
	15	30	50	50	70	90	90	120	-	-
	30	50	30	50	70	90	90	120	-	-