31P02NO
(31P02-200-0201)

Carte écoforestière



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie

Code	Description	+ 7m	-7m	Improductif	Non forestier
P	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3e	X			
SBSB	Groupement d'essence 4e	X			
A	Indice densité	X	X		
J	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention origine	X	X		
T8	Année d'intervention d'origine	X	X		
JIN	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
S8	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
VRN	Code de terrain 3e	X		X	X
NF	Code de terrain 4e	X		X	X

Exemple d'appellation

+7m de hauteur	-7m de hauteur	Improductif	Non forestier
SS B 3 JIN EC 96 C SBSB A2 50 D	CJ 98 D F A 5 CT 78 10 D	A DH	NF

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.
F

MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
M

CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 3e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 3e
O	Épinette blanche	BB	Bouleau à papier
E	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux
PR	Pin rouge	CC	Caryer cordiforme
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif
MS	Mélèze laricin	FG	Frêne de Pennsylvanie
PU	Pinche de Fréd	FR	Frêne noir
RX	Résineux indéterminés	FI	Feuillu intolérant (1)
SB	Sapin Baumier	FT	Feuillu tolérant (2)
C	Thuya occidental	HG	Hêtre à grandes feuilles
		PE	Peuplier faux-tremble
		PT	Peuplier faux-tremble
		TA	Tilleul d'Amérique

CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 4e et 5e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4e et 5e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4e et 5e
EB	Épinette blanche	BP	Bouleau à papier	FX	Feuillus indéterminés
EP	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune	RNC	Résineux non commercial
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux	FA	Frêne d'Amérique
PR	Pin rouge	CC	Caryer cordiforme	HG	Hêtre à grandes feuilles
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif	CB	Orme d'Amérique
MS	Mélèze laricin	FG	Frêne de Pennsylvanie	OB	Orme blanc (parties dents
PU	Pinche de Fréd	FR	Frêne noir	PA	Peuplier baumier
RX	Résineux indéterminés	CR	Chêne rouge	PT	Peuplier faux-tremble
SB	Sapin Baumier	EO	Érable rouge	TA	Tilleul d'Amérique
TO	Thuya occidental	ES	Érable à sucre		

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Orme, Tilleul, Érable à sucre
(2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4e et 5e)
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4e et 5e)

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

		HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET CODOMINANTES						
		200 m²						
		22 m 17m à 22m	12m à 17m	7m à 12m	4m à 7m	2m à 4m	3m et -	
Classes de hauteur		1	2	3	4	5		
Classe de densité		A1	A2	A3	A4	A5	SO	SO
61% à 100%	A	B1	B2	B3	B4	B5	SO	SO
61% à 80%	B	C1	C2	C3	C4	C5	SO	SO
41% à 60%	C	D1	D2	D3	D4	D5	SO	SO
25% à 40%	D							
	H	Densité recouvrement haute					15**	
	I	Densité recouvrement inférieure					(7*	

(*): Information provenant d'image satellite

CLASSES D'ÂGE

PEUPLEMENTS ÉQUIENNES	10 (0 à 20)	30 (21 à 40)	50 (41 à 60)	70 (61 à 80)	90 (61 à 100)	120 (101 et plus)
PEUPLEMENTS INÉQUIENNES ou IRRÉGULIER	Jeune inequienne ou irrégulier (origine < 80 ans)					
	Vieux inequienne ou irrégulier (origine > 80 ans)					
	Vin-Vir					

PEUPLEMENTS ÉTAGÉS											
	15	35	50	70	90	120					
	30	50	70	90	120						
	50	70	90	120							
	70	90	120								
	90	120									
	120										
	15	35	50	70	90	120	15	-	-	-	-
	30	50	70	90	120		30	-	-	-	-
	50	70	90	120			50	-	-	-	-
	70	90	120				70	-	-	-	-
	90	120					90	-	-	-	-
	120						120	-	-	-	-
	15	35	50	70	90	120					
	30	50	70	90	120						
	50	70	90	120							
	70	90	120								
	90	120									
	120									