32A02SO
(32A02-200-0101)

Carte écoforestière



STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie

Code	Description	+ 7m	- 7m	Improductif	Non forestier
E	Type de couvert	X	X		
ES	Groupement d'essence 3e	X	X		
ESH	Groupement d'essence 5e	X	X		
Z	Indice densité	X	X		
J	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention d'origine	X	X		
TS	Année d'intervention d'origine	X	X		
AN	Classe d'âge	X	X		
PJ	Intervention partielle	X	X		
DE	Année d'intervention partielle	X	X		
* DH	Code de terrain 3e	X	X	X	X
DH	Code de terrain 5e	X	X	X	X

Exemple d'appellation

+ 7m de hauteur	- 7m de hauteur	Improductif	Non forestier
50 B 3 JIN EC 98 C S5SB A2 5B B	CJ 95 B FA 5 CT 78 10 D	A DH	NF

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MELANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
M

CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 3e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 3e
G	Épinette blanche	BB	Bouleau à papier
E	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune
PB	Pin blanc	CH	Chêne rouge
PR	Pin rouge	ED	Érable rouge
PG	Pin gris	EP	Érable à sucre
ME	Mélèze laricin	FT	Feuillu tolérant (1)
PU	Pruche de l'est	FI	Feuillu intolérant (2)
R	Réseineux indéterminés	FH	Feuillu humide (3)
S	Sapin Baumier	FNC	Feuillu non commercial
C	Thuya occidentalis	PE	Peuplier
		FI	Feuillu intolérant

CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 4e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4e
EB	Épinette blanche	BP	Bouleau à papier	FX	Feuillus indéterminés
EP	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune	FNC	Feuillus non commercial
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux	FA	Frêne d'Amérique
PR	Pin rouge	CC	Caryer cordiforme	HG	Hêtre à grandes feuilles
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif	ORA	Orme d'Amérique
ML	Mélèze laricin	OH	Chêne à gros fruits	PD	Peuplier à grandes dents
PU	Pruche de l'est	CH	Chêne à gros fruits	PT	Peuplier faux-tremble
RX	Réseineux indéterminés	CR	Chêne rouge	PT	Peuplier faux-tremble
SB	Sapin Baumier	ED	Erable rouge	TA	Tilleul d'Amérique
TO	Thuya occidentalis	ES	Erable à sucre		

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostryer, Tilleul (applicable 4e)
(2) Ex: Peuplier, Bouleau, Erable rouge en association (applicable 4e)
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4e)

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

Classes de hauteur (m)	1	2	3	4	5	6	7
	22 m +	17 m à 22 m	12 m à 17m	7 m à 12m	4m à 7m	2 m à 4m	2m et -
Classe de densité	HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET CODOMINANTES (en m)						
61% à 100%	A	A1	A2	A3	A4	A5	SO	SO
41% à 60%	B	B1	B2	B3	B4	B5	SO	SO
21% à 40%	C	C1	C2	C3	C4	C5	SO	SO
25% et 40%	D	D1	D2	D3	D4	D5	SO	SO
	E	Densité recouvrement haute						
	I	Densité recouvrement inférieure						0*

(*) Information provenant d'image satellite

CLASSES D'ÂGE

PEUPLEMENTS ÉQUIENNES	10 (0 à 20)	30 (21 à 40)	50 (41 à 60)	70 (61 à 80)	80 (81 à 100)	90 (101 et plus)	
PEUPLEMENTS INÉQUIENNES OU IRRÉGULIER	Jeune inéquienne ou irrégulier (origine < 60 ans)					Jin-Jr	
	Vieux inéquienne ou irrégulier (origine > 80 ans)					Vin-Vr	
PEUPLEMENTS ÉTAGÉS	10	30	50	70	90	100	-
	30	50	70	90	100	-	-
	50	70	90	100	-	-	-
	70	90	100	-	-	-	-
	90	100	-	-	-	-	-
	100	100	-	-	-	-	-

PEUPLEMENTS ÉTAGÉS										
	10	30	50	70	90	100	-	-	-	-
	30	50	70	90	100	-	-	-	-	-
	50	70	90	100	-	-	-	-	-	-
	70	90	100	-	-	-	-	-	-	-
	90	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	100	-	-	-