32H13SE
(32H13-200-0102)

Carte écoforestière



32H13SE
(32H13-200-0102)

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie

Code	Description	+ 7m	-7m	Improductif	Non forestier
P	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3e	X			
SBSB	Groupement d'essence 4e	X			
A	Indice densité	X	X		
2	Indice hauteur	X	X		
TI	Intervention d'origine	X	X		
TI1	Année d'intervention d'origine	X	X		
CJ	Classe d'âge	X	X		
IP	Intervention partielle	X	X		
IP1	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
DH	Code de terrain 3e	X		X	X
NF	Code de terrain 4e	X		X	X

Exemple d'appellation

+7m de hauteur	-7m de hauteur	Improductif	Non forestier
SS B 3 JIN EC 96 C SBSB A2 50 D	CJ 98 D F A 5 CT 76 10 D	A DH	NF

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.
F

MELANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
M

CODE	ESSENCES RESINEUSES 3e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 3e
O	Épinette blanche	BB	Bouleau à papier
E	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux
PR	Pin rouge	CC	Caryer cordiforme
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif
ME	Mélèze laricin	FT	Frêne à fruits forts
PU	Pruche de l'est	CH	Chêne bicolore
B	Sapin baumier/vernissé	CR	Chêne rouge
S	Sapin Baumier	EG	Érable rouge
C	Thuya occidental	ES	Érable à sucre
		FTI	Feuillus tolérant (1)
		FI	Feuillus intolérant (2)
		FNC	Feuillus non commercial
		PE	Peuplier
		FT	Feuillu tolérant

CODE	ESSENCES RESINEUSES 4e et 5e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4e et 5e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4e et 5e
EB	Épinette blanche	BP	Bouleau à papier	FX	Feuillus indéterminés
EP	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune	FNC	Feuillus non commercial
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux	FA	Frêne d'Amérique
PR	Pin rouge	CC	Caryer cordiforme	HG	Hêtre à grandes feuilles
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif	CB	Orme d'Amérique
ML	Mélèze laricin	FT	Frêne à fruits forts	OT	Ostrya de houblon
PU	Pruche de l'est	CH	Chêne bicolore	PA	Peuplier baumier
RX	Résineux indéterminés	CR	Chêne rouge	PT	Peuplier faux-tremble
SB	Sapin Baumier	EG	Érable rouge	TA	Tilleul d'Amérique
TO	Thuya occidental	ES	Érable à sucre		

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Ostheer, Tilleul (applicable 4e et 5e)
(2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4e et 5e)
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4e et 5e)

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

		HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET CODOMINANTES						
		22 m	17m à 22m	12m à 17m	7m à 12m	4m à 7m	2m à 4m	2m et -
Classes de hauteur		1	2	3	4	5	6	7
Classe de densité								
81% à 100%	A	A1	A2	A3	A4	A5	SO	SO
61% à 80%	B	B1	B2	B3	B4	B5	SO	SO
41% à 60%	C	C1	C2	C3	C4	C5	SO	SO
25% à 40%	D	D1	D2	D3	D4	D5	SO	SO
	H	Densité recouvrement haute						0?*
	I	Densité recouvrement inférieure						7?*

(*): Information provenant d'image satellite

CLASSES D'ÂGE

PEUPLEMENTS ÉQUIENNES	10 (0 à 20)	30 (21 à 40)	50 (41 à 60)	70 (61 à 80)	80 (81 à 100)	90 (101 et plus)
PEUPLEMENTS INÉQUIENNES OU IRRÉGULIER	Vieux inequienne ou irégulier (origine > 80 ans)					Vin-Vir
PEUPLEMENTS ÉTAGÉS	15 / 30	30 / 50	50 / 70	70 / 90	75 / 90	90 / 120
	30 / 50	50 / 70	50 / 70	70 / 90	90 / 120	120 / 120
	10 / 30	30 / 50	50 / 70	50 / 70	70 / 90	90 / 120
	10 / 30	30 / 50	50 / 70	70 / 90	70 / 90	90 / 120
	10 / 30	30 / 50	50 / 70	70 / 90	90 / 120	- / -