


## Carte écoforestière



## STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie		+7m		-7m		Improductif		Non forestier	
Code	Description	J +7m	J -7m	J +7m	J -7m	J Improductif	J Non forestier	J Improductif	J Non forestier
SS	Type de couvert	X							
SEIS	Groupe/essence 3 <sup>a</sup>	X							
S	Groupe/essence 4 <sup>a</sup>	X							
1	Indice hauteur	X							
78	Année d'intervention d'origine	X	X						
JN	Classe d'âge	X	X						
CC	Interventions partielles	X	X						
98	Interventions totales	X	X	X	X				
EC	Code de terrains 3 <sup>b</sup>	X	X	X	X				
DH	Code de terrains 4 <sup>b</sup>	X	X	X	X				

Exemple d'appellation

+7m de hauteur	-7m de hauteur
JN EC 98 C	CJ 98 D
GDSS AD 50 D	F A S CT 78 10 D

+7m de hauteur	-7m de hauteur	Improductif	Non forestier
JN EC 98 C	CJ 98 D	NF	NP

<sup>a</sup> Année de l'intervention et <sup>b</sup> code de terrains

## TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RESINEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.

FEUILLEUX Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MÉLANGES Peuplement où les essences feuillues et résineuses occupent individuellement plus de 20% et moins de 75% de la surface terrière totale.

CODE	ESSENCE RESINEUSES 3 <sup>a</sup>	CODE	ESSENCE FEUILLEUSES 3 <sup>a</sup>	CODE	ESSENCE FEUILLEUSES 4 <sup>a</sup> & 5 <sup>a</sup>	CODE	ESSENCE FEUILLEUSES 4 <sup>a</sup> & 5 <sup>a</sup>
U	Erable à sucre	BP	Bouleau jaune	BP	Bouleau jaune	FX	Bouleau jaune
E	Erable rouge et noir	BU	Bouleau gris	PR	Erable rouge	FR	Frêne d'Amérique
P	Pin blanc	CF	Erable noir	PS	Pin blanc	FA	Frêne à écorce bleue
ME	Pin noir	CR	Erable à sucre	CT	Chêne Tardif	FC	Orme à écorce bleue
R	Merisier luisant	DR	Erable à sucre	CH	Chêne rouge	GD	Orme à écorce rouge
RD	Resineux indéterminé	DS	Erable noir	CR	Chêne rouge	SD	Orme à écorce verte
RC	Erable à sucre	DT	Erable à sucre	PT	Prêcheur fauve-tremble	SG	Orme à écorce grise
TO	Thuya occidental	ES	Erable à sucre	TA	Prêcheur d'Amérique		

(1) Chêne, Frêne, Hêtre, Noisetier, Chêne à lames (appelé 4<sup>a</sup>)  
(2) Chêne à lames, Frêne à écorce bleue (appelé 5<sup>a</sup>)  
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (appelé 4<sup>a</sup> et 5<sup>a</sup>)

HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET COORDONNATES							
22 m							
44 m							
12m à 22m							
12m à 12m							
40 à 49 m							
20 à 39 m							
7 m							

Classes de hauteur

1	2	3	4	5	6	7
A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	SD	SD
B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	SD	SD
C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	SD	SD
D 1	D 2	D 3	D 4	D 5	SD	SD
E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	SD	SD

Densité recouvrement haute

Densité recouvrement moyenne

Densité recouvrement inférieure

(\*): Information provenant d'image satellite

CLASSES D'ÂGE	
PEUPLEMENTS ECOFORESTIERS	10 20 30 40 50 60 70 80 90
PEUPLEMENTS IRREGULIERS OU INREGULIERS	jeune inéquale ou irrégulier (origine > 80 ans)
Vieux inéquale ou irrégulier (origine > 80 ans)	Jm/Vr
PEUPLEMENTS ETAGES	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Vie/Vr	Vie/Vr

PERTURBATIONS D'ORIGINE		INTERVENTIONS PARTIELLES	
CHT	Chablis total	CON	Conversion de peuplement
DT	Déplacement total	COL	Conversion à diamètre limite
LS	Déplacement partiel	COL	Conversion avec déplacement partiel
BR	Bruit total	DRG	Conversion avec déplacement total
FR	Friché	CAM	Conversion d'exploitation
VER	Herbe grasse	CDR	Conversion en déboisement

INTERVENTIONS D'ORIGINE

CPR	Coupe avec protection de la régénération
CRS	Coupe avec réserve de semences
CRS	Coupe progressive d'ensemencement
CPE	Coupe progressive d'élimination
CT	Coupe totale
CB	Chopage et exploitation dans le bûlage
ETR	Exploitation avec mise en séries
DU	Plantation de semis
EM	Plantation de semis cultivés à racines nues
PLN	Plantation de semis cultivés à racines nus et racines mortes de la rég. d'ensemencement
PLN	Plantation de semis cultivés à racines nus et racines mortes de la rég. d'ensemencement
PLB	Plancher
REA	Régarde
REU	Régarde d'une échancrure
RPS	Régarde par une infrastructure abandonnée

PERTURBATIONS MOYENNES

ECL	Chablis partiel
CRN	Chablis partiel
RBR	Chablis partiel avec boutures
RBR	Chablis partiel avec plantes utilisées à racines nues
RBR	Regarde de plantes cultivées en réceptacle

TERRAINS FORESTIERS IMPRODUCTIFS		CLASSES DE PENTE	
CODE	DÉSIGNATION	TAUX D'INCLINAISON	
DH	Débord ou semi-débord humide	0% à 2%	
DS	Faible	2% à 4%	
DA	Double	4% à 6%	
DC	Modérée	6% à 8%	
DE	Fortement	16% à 20%	
DF	Très forte	21% à 30%	
FE	Abrupte	41% et plus	
F	Sommet	Entre 41% et plus	

