32K04NE
(32K04-200-0202)

Carte écoforestière



32K04NE
(32K04-200-0202)

STRATIFICATION ÉCOFORESTIÈRE

Paramètres utilisés pour la cartographie

Code	Description	+ 7m	-7m	Improductif	Non forestier
P	Type de couvert		X		
SS	Groupement d'essence 3e	X			
SBSB	Groupement d'essence 4e	X			
A	Indice densité	X	X		
Z	Indice hauteur	X	X		
CT	Intervention d'origine	X	X		
T8	Année d'intervention d'origine	X	X		
JH	Classe d'âge	X	X		
CJ	Intervention partielle	X	X		
S8	Année d'intervention partielle	X	X		
D	Classe de pente	X	X	X	
CH	Code de terrain 3e	X		X	X
NF	Code de terrain 4e	X		X	X

Exemple d'appellation

+ 7m de hauteur	-7m de hauteur	Improductif	Non forestier
SS B 3 JH EC 96 C SBSB A2 50 D	CJ 98 D F A 5 CT 78 10 D	A DH	NF

TYPES DE COUVERT ET ESSENCES SELON LE PROGRAMME D'INVENTAIRE

RÉSINEUX
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences résineuses.
R

FEUILLUS
Peuplement dont plus de 75% de la surface terrière totale est occupée par les essences feuillues.

MÉLANGES
Peuplement dont les essences feuillues et résineuses occupant individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface terrière totale.
M

CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 3e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 3e
O	Épinette blanche	BB	Bouleau à papier
E	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux
PR	Pin rouge	CC	Caryer cordiforme
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif
SE	Mélèze laricin	FT	Frêne à fruits forts
PU	Pruche de l'est	CH	Chêne bicolore
RX	Résineux indéterminés	CR	Chêne rouge
SB	Sapin baumier	EB	Érable noir
C	Thuya occidental	ES	Érable à sucre
		ET	Peuplier faux-tremble
		PI	Feuillu intolérant (2)
		FI	Feuillus intolérants
		FNC	Feuillu non commercial
		PE	Peuplier
		FX	Feuillu intolérant

CODE	ESSENCES RÉSINEUSES 4e et 5e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4e et 5e	CODE	ESSENCES FEUILLUES 4e et 5e
EB	Épinette blanche	BP	Bouleau à papier	FX	Feuillus indéterminés
EP	Épinette rouge et noire	BJ	Bouleau jaune	FNC	Feuillus non commercial
PB	Pin blanc	CF	Caryer à fruits doux	FA	Frêne d'Amérique
PR	Pin rouge	CC	Caryer cordiforme	HG	Hêtre à grandes feuilles
PG	Pin gris	CT	Cerisier Tardif	OB	Orme d'Amérique
SL	Mélèze laricin	FT	Frêne à fruits forts	OM	Orme de Thomas dents
PU	Pruche de l'est	CH	Chêne bicolore	PA	Peuplier baumier
RX	Résineux indéterminés	CR	Chêne rouge	PT	Peuplier faux-tremble
SB	Sapin baumier	EB	Érable noir	TA	Tilleul d'Amérique
TO	Thuya occidental	ES	Érable à sucre		

(1) Caryer, Chêne, Frêne, Hêtre, Noyer, Orme, Tilleul (applicable 4e et 5e)
(2) Ex: Peuplier, Bouleau, Érable rouge en association (applicable 4e et 5e)
(3) Frêne noir, Orme d'Amérique, Orme de Thomas, Orme rouge (applicable 4e et 5e)

INDICES DENSITÉ-HAUTEUR

	HAUTEUR MOYENNE DES TIGES DOMINANTES ET CODOMINANTES						
	22 m et +	17m à 22m	12m à 17m	7m à 12m	4m à 7m	2m à 4m	2m et -
Classes de hauteur	1	2	3	4	5	6	7
Classe de densité							
61% à 100% A	A1	A2	A3	A4	A5	SO	SO
61% à 80% B	B1	B2	B3	B4	B5	SO	SO
41% à 60% C	C1	C2	C3	C4	C5	SO	SO
25% à 40% D	D1	D2	D3	D4	D5	SO	SO
H	Densité recouvrement haute						H7*
I	Densité recouvrement inférieure						I7*

(*): Information provenant d'image satellite

CLASSES D'ÂGE

PEUPLEMENTS ÉQUIENNES	10 (0 à 20)	30 (21 à 40)	50 (41 à 60)	70 (61 à 80)	80 (81 à 100)	90 (101 et plus)
PEUPLEMENTS INÉQUIENNES OU IRRÉGULIER	Vieux inequienne ou irégulier (origine > 80 ans)					Vin-Vir
PEUPLEMENTS ÉTAGÉS	15 / 10	35 / 10	55 / 10	80 / 10	75 / 70	90 / 70	125 / 120
	30 / 10	50 / 10	70 / 10	80 / 10	80 / 70	90 / 70	125 / 120
	10 / 30	30 / 30	50 / 30	70 / 30	70 / 70	90 / 70	125 / 120
	10 / 50	30 / 50	50 / 50	70 / 50	70 / 70	90 / 70	125 / 120
	10 / 70	30 / 70	50 / 70	70 / 70	70 / 70	90 / 70	125 / 120
	10 / 90	30 / 90	50 / 90	70 / 90