

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01254

| Essences ou groupe d'essences | Groupe de calcul | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | ERABLES | MIXTEBOPR | MIXTEPEUR | MIXTERBOP | MIXTERBOUR | MIXTERPEU | MPEURBR | MRBOPPA | MRRBOPBR | PEU | SEPM | SEPMBR | SEPMC2 | SEPMC3 | SEPMPA | SEPMTHO |
| Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| PIPR | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| Pruche de l'Est | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sapin baumier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette noire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette blanche | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette rouge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélèzes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thuya occidental | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences résineuses | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| Volume en mètres cubes par année en déroulage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau à papier | | | | 11 | | | | | | | 21 | | | | | |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | | | | 11 | 32 | | | | | | 11 | | | | | |
| Peuplier faux tremble | 11 | 20 | 220 | 96 | | 13 | | 10 | | 30 | 11 | | | | | |
| Peuplier baumier | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable à sucre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable rouge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | 11 | 20 | 220 | 118 | 32 | 13 | | 10 | | 30 | 43 | | | | | |
| Toutes essences | 11 | 20 | 220 | 118 | 32 | 13 | | 10 | | 30 | 43 | | | | | 50 |

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en poteau, en bardeau ou en déroulage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01254

| Essences ou groupe d'essences | THO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Volume en mètres cubes par année en poteau et en bardeau (suite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIPR | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruche de l'Est | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sapin baumier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette noire | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette blanche | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette rouge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélèzes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thuya occidental | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences résineuses | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume en mètres cubes par année en déroulage (suite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau à papier | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peuplier faux tremble | | 411 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peuplier baumier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable à sucre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable rouge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | | 497 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toutes essences | | 547 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01254

| Essences ou groupe d'essences | Groupe de calcul | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | ERABLES | MIXTEBOPR | MIXTEPEUR | MIXTERBOP | MIXTERBOUR | MIXTERPEU | MPEURBR | MRBOPPA | MRRBOPBR | PEU | SEPM | SEPMBR | SEPMC2 | SEPMC3 | SEPMPA | SEPMTHO |
| Volume en mètres cubes par année en sciage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| PIPR | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| Pruche de l'Est | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sapin baumier | 286 | 519 | 931 | 8 317 | 1 483 | 586 | | 343 | 69 | 127 | 63 030 | 843 | 539 | 1 186 | 206 | 1 123 |
| Épinette noire | | | 167 | 158 | | 102 | | | | 20 | 3 774 | 29 | | 78 | 10 | 146 |
| Épinette blanche | 11 | 98 | 559 | 2 342 | 159 | 166 | | 98 | 20 | 39 | 14 132 | 216 | 176 | 265 | 59 | 156 |
| Épinette rouge | | | 323 | 305 | 21 | 76 | | 10 | | | 569 | | | 10 | | 21 |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélèzes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPM | 297 | 617 | 1 980 | 11 122 | 1 663 | 930 | | 451 | 89 | 186 | 81 505 | 1 088 | 715 | 1 539 | 275 | 1 446 |
| Thuya occidental | | | 90 | 399 | | | | | | | 785 | | | | | 95 |
| Essences résineuses | 297 | 617 | 2 070 | 11 521 | 1 663 | 930 | | 451 | 89 | 186 | 82 290 | 1 088 | 715 | 1 539 | 275 | 1 581 |
| Bouleau à papier | 32 | 90 | 260 | 836 | 43 | 26 | | 50 | | 60 | 2 037 | 20 | 20 | 40 | 10 | 170 |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | 32 | | | 260 | 241 | | | | | | 374 | | | | | |
| Peuplier faux tremble | 54 | 180 | 2 770 | 654 | | 91 | 40 | 40 | | 390 | 222 | | | | | 42 |
| Peuplier baumier | | | 70 | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable à sucre | 119 | | | | 43 | | | | | 40 | 32 | | | | | |
| Érable rouge | 32 | | | | 54 | | | | | | | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | 269 | 270 | 3 100 | 1 750 | 381 | 117 | 40 | 90 | | 490 | 2 665 | 20 | 20 | 40 | 10 | 212 |
| Toutes essences | 566 | 887 | 5 170 | 13 271 | 2 044 | 1 047 | 40 | 541 | 89 | 676 | 84 955 | 1 108 | 735 | 1 579 | 285 | 1 793 |

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en sciage par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

| Essences ou groupe d'essences | THO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Volume en mètres cubes par année en sciage (suite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIPR | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruche de l'Est | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sapin baumier | 255 | 79 843 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette noire | 225 | 4 709 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette blanche | 176 | 18 672 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette rouge | 39 | 1 374 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélèzes | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPM | 734 | 104 637 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thuya occidental | 2 412 | 3 781 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences résineuses | 3 146 | 108 458 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau à papier | | 3 694 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | | 907 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peuplier faux tremble | | 4 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peuplier baumier | | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable à sucre | | 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable rouge | | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | | 9 474 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toutes essences | 3 146 | 117 932 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01254

| Essences ou groupe d'essences | Groupe de calcul | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ERABLES | MIXTEBOPR | MIXTEPEUR | MIXTERBOP | MIXTERBOUR | MIXTERPEU | MPEURBR | MRBOPPA | MRRBOPBR | PEU | SEPM | SEPMBR | SEPMC2 | SEPMC3 | SEPMPA | SEPMTHO |
| Volume en mètres cubes par année en pâte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| PIPR | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| Pruche de l'Est | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sapin baumier | 18 | 59 | 88 | 735 | 127 | 51 | | 29 | 10 | 10 | 5 468 | 69 | 49 | 98 | 20 | 94 |
| Épinette noire | | | 10 | 11 | | 13 | | | | | 310 | | | 10 | | 10 |
| Épinette blanche | | 10 | 49 | 189 | 11 | 13 | | 10 | | | 1 168 | 20 | 20 | 20 | | 10 |
| Épinette rouge | | | 29 | 21 | | 13 | | | | | 41 | | | | | |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélèzes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPM | 18 | 69 | 176 | 956 | 138 | 90 | | 39 | 10 | 10 | 6 987 | 89 | 69 | 128 | 20 | 114 |
| Thuya occidental | | | 12 | 32 | | | | | | | 63 | | | | | 11 |
| Essences résineuses | 18 | 69 | 188 | 988 | 138 | 90 | | 39 | 10 | 10 | 7 050 | 89 | 69 | 128 | 20 | 135 |
| Bouleau à papier | 77 | 1 210 | 940 | 2 477 | 281 | 104 | | 250 | | 240 | 8 706 | 80 | 80 | 160 | 290 | 679 |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | 77 | | | 488 | 383 | | | | | | 791 | | | | | |
| Peuplier faux tremble | 42 | 300 | 4 910 | 643 | | 156 | 60 | 50 | | 680 | 401 | | | | | 64 |
| Peuplier baumier | | | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable à sucre | 205 | | | | 65 | | | | | 60 | 179 | | | | | |
| Érable rouge | 75 | | 100 | 1 177 | 162 | 130 | | | | | 527 | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | 476 | 1 510 | 6 080 | 4 785 | 891 | 390 | 60 | 300 | | 980 | 10 604 | 80 | 80 | 160 | 290 | 743 |
| Toutes essences | 494 | 1 579 | 6 268 | 5 773 | 1 029 | 480 | 60 | 339 | 10 | 990 | 17 654 | 169 | 149 | 288 | 310 | 878 |

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable en pâte par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

| Essences ou groupe d'essences | THO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Volume en mètres cubes par année en pâte (suite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIPR | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruche de l'Est | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sapin baumier | 20 | 6 945 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette noire | 20 | 384 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette blanche | 10 | 1 530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette rouge | | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélèzes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPM | 50 | 8 963 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thuya occidental | 201 | 319 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences résineuses | 251 | 9 292 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau à papier | | 15 574 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | | 1 739 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peuplier faux tremble | | 7 306 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peuplier baumier | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable à sucre | | 509 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable rouge | | 2 171 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | | 27 429 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toutes essences | 251 | 36 721 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006*

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 01254

| Essences ou groupe d'essences | Groupe de calcul | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | ERABLES | MIXTEBOPR | MIXTEPEUR | MIXTERBOP | MIXTERBOUR | MIXTERPEU | MPEURBR | MRBOPPA | MRRBOPBR | PEU | SEPM | SEPMBR | SEPMC2 | SEPMC3 | SEPMPA | SEPMTHO |
| Volume en mètres cubes par année tous produits | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| PIPR | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| Pruche de l'Est | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sapin baumier | 304 | 578 | 1 019 | 9 052 | 1 610 | 637 | | 372 | 79 | 137 | 68 498 | 912 | 588 | 1 284 | 226 | 1 217 |
| Épinette noire | | | 177 | 169 | | 115 | | | | 20 | 4 084 | 29 | | 88 | 10 | 156 |
| Épinette blanche | 11 | 108 | 608 | 2 531 | 170 | 179 | | 108 | 20 | 39 | 15 300 | 236 | 196 | 285 | 59 | 166 |
| Épinette rouge | | | 352 | 326 | 21 | 89 | | 10 | | | 610 | | | 10 | | 21 |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélèzes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPM | 315 | 686 | 2 156 | 12 078 | 1 801 | 1 020 | | 490 | 99 | 196 | 88 492 | 1 177 | 784 | 1 667 | 295 | 1 560 |
| Thuya occidental | | | 102 | 431 | | | | | | | 848 | | | | | 106 |
| Essences résineuses | 315 | 686 | 2 258 | 12 509 | 1 801 | 1 020 | | 490 | 99 | 196 | 89 340 | 1 177 | 784 | 1 667 | 295 | 1 766 |
| Bouleau à papier | 109 | 1 300 | 1 200 | 3 324 | 324 | 130 | | 300 | | 300 | 10 764 | 100 | 100 | 200 | 300 | 849 |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | 109 | | | 759 | 656 | | | | | | 1 176 | | | | | |
| Peuplier faux tremble | 107 | 500 | 7 900 | 1 393 | | 260 | 100 | 100 | | 1 100 | 634 | | | | | 106 |
| Peuplier baumier | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable à sucre | 324 | | | | 108 | | | | | 100 | 211 | | | | | |
| Érable rouge | 107 | | 100 | 1 177 | 216 | 130 | | | | | 527 | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | 756 | 1 800 | 9 400 | 6 653 | 1 304 | 520 | 100 | 400 | | 1 500 | 13 312 | 100 | 100 | 200 | 300 | 955 |
| Toutes essences | 1 071 | 2 486 | 11 658 | 19 162 | 3 105 | 1 540 | 100 | 890 | 99 | 1 696 | 102 652 | 1 277 | 884 | 1 867 | 595 | 2 721 |

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.

* Réalisé à partir des résultats de la possibilité forestière annoncée en décembre 2006 par le Forestier en chef et ventilés selon les matrices de répartition par produits de Forêt Québec de juin 2006.

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013 ajustée suite aux décisions du Forestier en chef

Unité d'aménagement forestier (UAF) :

| Essences ou groupe d'essences | THO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Volume en mètres cubes par année tous produits (suite) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIPR | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruche de l'Est | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sapin baumier | 275 | 86 788 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette noire | 245 | 5 093 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette blanche | 186 | 20 202 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette rouge | 39 | 1 478 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mélèzes | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPM | 784 | 113 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thuya occidental | 2 613 | 4 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences résineuses | 3 397 | 117 800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau à papier | | 19 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | | 2 700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peuplier faux tremble | | 12 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peuplier baumier | | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable à sucre | | 743 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Érable rouge | | 2 257 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | | 37 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toutes essences | 3 397 | 155 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note : La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF)