

Niveau de récolte probable tous produits par essence ou groupe d'essences et par groupe de calcul en fonction de la possibilité forestière 2008-2013
ajustée suite aux décisions du Forestier en chef de décembre 2006

Unité d'aménagement forestier (UAF) : 03151

| Essences ou groupe d'essences | Groupe de calcul | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | |
|---|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | BOPGL | BOUGH | ERSGK | MBOFIFGD | MBOFIRGC | MBOFSFGJ | MPEFIFGG | SEPMGA | SEPMGB | | | | | | | | |
| Volume en mètres cubes par année tous produits | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin blanc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin rouge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIPR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pruche de l'Est | | | | | | 104 | | | 96 | | 200 | | | | | | |
| Sapin baumier | 541 | 1 025 | 169 | 2 883 | 5 749 | 10 178 | 601 | 19 296 | 2 134 | 42 576 | | | | | | | |
| Épinette noire | 165 | 20 | | 217 | 362 | 267 | 37 | 9 503 | 263 | 10 834 | | | | | | | |
| Épinette blanche | 304 | 101 | | 444 | 952 | 668 | 292 | 1 746 | 225 | 4 732 | | | | | | | |
| Épinette rouge | 83 | 60 | 42 | 278 | 1 031 | 2 431 | 94 | 4 789 | 685 | 9 493 | | | | | | | |
| Épinette de Norvège | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pin gris | 106 | | | 83 | 8 | | 9 | 103 | | 309 | | | | | | | |
| Mélèzes | | | | | | | | 56 | | 56 | | | | | | | |
| SEPM | 1 199 | 1 206 | 211 | 3 905 | 8 102 | 13 544 | 1 033 | 35 493 | 3 307 | 68 000 | | | | | | | |
| Thuya occidental | | | | | | 270 | | 164 | 66 | 500 | | | | | | | |
| Essences résineuses | 1 199 | 1 206 | 211 | 3 905 | 8 102 | 13 918 | 1 033 | 35 753 | 3 373 | 68 700 | | | | | | | |
| Bouleau à papier | 5 669 | 1 437 | | 8 822 | 3 458 | 3 461 | 671 | 1 344 | 538 | 25 400 | | | | | | | |
| Bouleau gris | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouleau jaune | 1 068 | 6 036 | 861 | 841 | 1 602 | 16 192 | 382 | 2 007 | 611 | 29 600 | | | | | | | |
| Peuplier faux tremble | 590 | | | 767 | 320 | 105 | 6 279 | 192 | 61 | 8 314 | | | | | | | |
| Peuplier baumier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peupliers hybrides | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres peupliers | 23 | | | | | | 47 | | 16 | 86 | | | | | | | |
| Érable à sucre | 76 | 2 359 | 1 077 | 77 | 321 | 2 513 | | | 77 | 6 500 | | | | | | | |
| Érable rouge | 612 | 410 | 107 | 230 | 400 | 2 086 | 191 | 287 | 77 | 4 400 | | | | | | | |
| Hêtre à grandes feuilles | | | 562 | | | 438 | | | | 1 000 | | | | | | | |
| Chênes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frêne noir | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autre frênes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tilleul d'Amérique | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostrier de Virginie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres feuillus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essences feuillues | 8 038 | 10 242 | 2 607 | 10 737 | 6 101 | 24 795 | 7 570 | 3 830 | 1 380 | 75 300 | | | | | | | |
| Toutes essences | 9 237 | 11 448 | 2 818 | 14 642 | 14 203 | 38 713 | 8 603 | 39 583 | 4 753 | 144 000 | | | | | | | |

La répartition du volume par essence ou groupe d'essences est établie uniquement pour la période de validité du plan général d'aménagement forestier (PGAF) et est basé sur le premier palier retenu de la méthode d'évaluation de la possibilité forestière.